



MIG
<p>promotore della crescita, rinvigorente uso fogliare e radicale</p> <ul style="list-style-type: none"> • LIQUIDO • A BASE DI ESTRATTI VEGETALI • PROMOTORE DELLA CRESCITA • AUMENTA LA VELOCITA' DI MOLTIPLICAZIONE CELLULARE • AZIONE ANTISTRESS

Composizione

glucosidi flavonici, ossicumarine, vitamine del gruppo B, antocianine 2 g, acido nicotinico 0,1 g, soluzione equilibrata di microelementi (B, Co, Fe, Mn, Zn) 50 g

Caratteristiche

MIG, prodotto liquido, promotore della crescita vegetativa.

E' composto da sostanze naturali che intervengono nella formazione degli acidi nucleici (RNA e DNA). Rinforza le pareti cellulari e ne velocizza la moltiplicazione, stimola la pianta alla produzione di nuovi apici radicali e vegetativi, aumenta e accelera in modo evidente la crescita vegetativa e floreale, aumenta le difese immunitarie conferendo robustezza e resistenza contro stress e malattie; riduce i tempi di maturazione di frutta e ortaggi e ne aumenta visibilmente la pezzatura; aiuta le piante a superare momenti di crisi dovuti a malattie, colpi di freddo o di caldo, gelate o siccità. Gli effetti del trattamento sono rapidissimi: il prodotto agisce sulla pianta in 4-5 ore e gli effetti sono evidenti dopo 3-4 giorni; i risultati più rapidi si ottengono con trattamenti per via fogliare.

Applicazioni

Su tutte le colture.

Dosi e modalità d'impiego

orticole da frutto	0,5 - 0,8 kg/ha	fogliare	a partire dal trapianto ogni 7-14 giorni fino alla prima fioritura
	1,5 - 2 kg/ha	radicale	
orticole da foglia	0,3 - 0,7 kg/ha	fogliare	a partire dal trapianto ogni 7-14 giorni fino alla raccolta
	1,5 - 2 kg/ha	radicale	
frutticole	0,5 - 1 kg/ha	fogliare	nei momenti in cui si vuole favorire l'apparato vegetativo
	1,5 - 2 kg/ha	radicale	
vite	0,5 - 1 kg/ha	fogliare	2-3 trattamenti dalla ripresa vegetativa a inizio fioritura
	1,5 - 2 kg/ha	radicale	
fragola	50 - 100 g/hl	fogliare	unito ad Exalt (300 g/hl) nei periodi di scarsa crescita
	1,5 - 2 kg/ha	radicale	
floricole	70 - 100 g/hl	fogliare	uno o più interventi a partire dal trapianto o rinvaso, ogni 7 giorni
	1,5 - 2 kg/ha	radicale	

L'applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici.

Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità

E' miscelabile con fungicidi ed insetticidi sistemici o translaminari di cui favorisce l'assorbimento e la diffusione.

Non miscelare con prodotti a base di rame o zolfo.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 22 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt